




Informe de Gira Agrícola N° 37

BOLSA DE CEREALES

Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO DEL 10/02/2014 AL
14/02/2014


Zona Norte de La Pampa
y Oeste de Buenos Aires



Departamentos Zona IX (N LP - O Bs. As.): Catriló, Chapaleufú, Conhelo, Maracó, Quemú-Quemú, Rancul, Realicó, Trenel, 9 de Julio, C. Casares, C. Tejedor, F. Ameghino, Gral. Pinto, Gral. Viamonte, Gral. Villegas, Lincoln, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Trenque Lauquen.

Resultados de la gira agrícola realizada por el Norte de La Pampa y el Oeste de Buenos Aires durante la segunda semana de Febrero de 2014:

- En cinco días se recorrieron 1.700 Km.
- Se relevaron cerca de 15 localidades.
- Se discutió la evolución regional de la campaña con referentes zonales.
- Se muestrearon lotes de soja, maíz y girasol.
- Se evaluó la condición y estado de cada uno de los cultivos bajo estudio.
- Se ajustaron las perspectivas a cosecha de los cultivos de gruesa.



Gruesa 2013/14

En gran parte de esta región el clima viene jugando un papel preponderante en las últimas campañas, tal es así que durante el ciclo 2012/13 el exceso de precipitaciones ocasionó fuertes reducciones de área y rinde. Actualmente (campaña 2013/14) se viene registrando una situación muy irregular, ya que las lluvias han sido muy heterogéneas desde que se inició la siembra de soja, maíz y girasol, llegando a ser nulas en los meses de diciembre y enero 2014. Cabe destacar que, durante la recorrida llevada a cabo en la segunda semana de diciembre de 2013 por esta misma región, ya adelantábamos que en el norte de La Pampa había signos visibles de déficit hídrico, habiéndose agravado aún más el panorama de los cultivos debido a los bajos registros hídricos.

Debido a estas condiciones los cultivos relevados presentaban una gran diversidad en su estado, y por otro lado, se pone en evidencia el manejo productivo (Siembra Directa, densidad, materiales y fechas de siembra, entre otros) llevado a cabo durante la campaña, el cual se refleja en los rindes esperados a cosecha.

En lo que respecta al estado sanitario de los cultivos, en el presente ciclo se registró un marcado ataque de insectos (lepidópteros) desde etapas tempranas. Estos ocasionaron severas defoliaciones, en girasol y soja, y a su vez grandes inconvenientes a la hora de realizar las aplicaciones pertinentes. De igual forma, las condiciones climáticas fueron desfavorables (altas temperaturas, baja humedad relativa y viento) a la hora de realizar las aplicaciones en tiempo y forma. Asimismo, las reiteradas lluvias de febrero han obligado a los productores a monitorear los cuadros con una mayor frecuencia, puesto que se están detectando enfermedades foliares.

A modo explicativo, en el cuadro que se detalla a continuación se muestran las precipitaciones acumuladas durante los últimos cuatro meses de la campaña para distintas localidades de nuestra zona PAS IX; esto explica en gran medida los diferentes escenarios observados en cada cultivo.

Precipitaciones* (mm)	Trenque Lauquen	Gral. Villegas	C. Tejedor	Gral. Pinto	Quemu - Quemu	E. Castex	Alta Italia
Noviembre 2013	 123	 154	 257	 148	 96	 80	 50
Diciembre 2013	 27	 63	 20	 51	 30	 20	 5
Enero 2014	 24	 38	 15	 199	 50	 11	 10
Febrero 2014	 90	 41	 100	 125	 135	 98	 50

*Datos obtenidos durante la gira agrícola, actualizados a la segunda semana de Febrero 2014.


Para poder hacer un análisis más detallado de la zona recorrida, podemos diferenciar 3 sub-regiones: la primera se encuentra en el corredor de la RN N°5, desde 9 de Julio hasta Catrillo, en donde por lo general la condición de los cultivos era de regular a buena. La segunda, desde Quemú-Quemú hacia el norte en donde la falta de precipitaciones fue muy marcada, lo que produjo un deterioro importante en la condición de los cultivos, y hoy por hoy se observa un panorama de malo a regular. Particularmente, en cercanías a General Pico hay cuadros puntuales en buenas condiciones; hacia el oeste de esta localidad hay una planicie con tosca lo que empeora el panorama de los cultivos, ya que los suelos presentan baja retención hídrica. Finalmente, en el corredor de la RN N°188 desde General Villegas hasta Lincoln, es en donde se percibe el escenario más alentador, ya que las lluvias durante diciembre y enero no fueron tan escasas como en las otras sub-regiones recién descritas, lo que permitió a los cultivos transitar las etapas críticas bajo mejores condiciones hídricas. Esta importante zona en su conjunto aporta en la actual campaña el 12 % de la superficie maicera nacional, el 7,8 % de soja y el 6,8% del girasol.

Soja:

- Si bien este cultivo presenta una gran plasticidad, un gran porcentaje de la soja de primera transitó su etapa crítica en el momento de menor oferta hídrica combinado con un período de elevadas temperaturas. Esto ocasionó un gran aborto de flores y en consecuencia una merma en el potencial de rendimiento. Estas disminuciones de rinde varían en cada una de las sub-regiones visitadas.
- En la presente campaña 2013/14, en esta zona se incrementó la superficie destinada a este importante cultivo, alcanzando las 1.590.000 hectáreas, siendo de esta manera un 16 % superior al área implantada durante el ciclo


2012/13. La superficie implantada en primera corresponde al 77 % del área, mientras que las siembras de segunda llegaron a ser el 23 % restante, detrás de trigo y cebada.

- Sobre el corredor de la RN N°5 la soja de primera transitaba desde inicio de fructificación a comienzos de llenado de grano (R3 a R5), presentando las hojas basales secas y con un fuerte ataque de insectos. La merma en el rendimiento potencial se ubicaría por debajo del histórico, pudiendo oscilar entre los 23 y 27 qq/Ha. Cabe destacar que los cuadros sembrados en noviembre presentan mejores perspectivas a cosecha en comparación a lo implantado durante el mes de octubre, dado que estos últimos sufrieron el estrés termo-hídrico. La soja de segunda ocupa entre un 15 y un 25 % de la superficie sojera total, al momento de la gira el grueso de los lotes transitaban desde comienzo a plena floración (R1-R2). Los cuadros sembrados detrás de cebada presentaban mejores condiciones que los que fueron implantados detrás del trigo. Por lo general, estos lotes presentaban un buen estado de cultivo, con fuertes chances de mejorar su condición debido a las lluvias registradas durante febrero.



- En el norte de La Pampa las lluvias fueron muy escasas, heterogéneas y erráticas durante diciembre y enero, sumado a elevadas temperaturas con viento norte. Esta sub-región presentaba una mayor diversificación de cultivos, ya que la soja no muestra un óptimo comportamiento en estos suelos, con lo cual los productores optan por una rotación con maíz y girasol. El grueso de los cuadros de soja de primera se encontraba en R3-R4 (inicio a plena fructificación) con un aceptable desarrollo vegetativo, con aborto de flores y con un bajo número de chauchas por planta. Al momento de la recorrida las productividades esperadas para esta campaña ya se ubicaban muy por debajo del histórico regional y con un elevado porcentaje de hectáreas perdidas. La soja de segunda, se pudo apreciar con un stand de plantas irregular y con un escaso desarrollo vegetativo, no obstante de registrarse buenas precipitaciones durante febrero-marzo el cultivo podría mostrar una respuesta y recuperarse para lograr buenos rindes a cosecha.

- Finalmente, desde Gral. Villegas hasta Lincoln y en el partido Rivadavia, el cultivo de soja presentaba de buenas a muy buenas condiciones, ya que en esta sub-zona las lluvias fueron más homogéneas, con una mayor frecuencia y mayor caudal durante los meses más demandante de humedad. La mayoría de los lotes transitaban la etapa crítica de fructificación con buenas reservas de humedad y con un óptimo desarrollo foliar. Se habían realizado aplicaciones para contrarrestar el daño de insectos, y al mismo tiempo ya comenzaban a realizar las aplicaciones de fungicida correspondientes para controlar enfermedades. Los rendimientos a cosecha esperados se ubican desde los 25 a 35 qq/Ha, con picos aislados de 40 qq/Ha.



1) Lote de soja en R1 en Trenel, La Pampa, en malas condiciones (11/02/14). 2) Soja de segunda sobre cebada en Trenque Lauquen, Buenos Aires, en R2 con buenas perspectivas a cosecha (10/02/14). 3) Lote de soja en R5 con 35 vainas promedio por planta y leve ataque de insectos. Ameghino, Buenos Aires (13/02/14).

Maíz:

- El área destinada a este importante cereal de verano sufrió una merma cercana al -9 % en comparación al ciclo previo, habiéndose implantado durante la actual campaña unas 424.000 Ha.


- Las fechas de siembra (tempranas y tardías) y la condición de los lotes de maíz, son muy heterogéneas en Buenos Aires y La Pampa, y a su vez en cada una de las sub-zonas analizadas.

- Una particularidad común a todas las sub-regiones analizadas es que los maíces implantados de manera temprana atravesaron el período crítico de definición de rendimiento con altas temperaturas y con baja a nula humedad en el perfil, afectando el rendimiento potencial en muchos casos. Por otro lado, numerosos cuadros ya habían sido picados al momento de la recorrida para consumo animal.

- A lo largo del corredor de la RN N°5, las siembras tardías se hicieron más fuertes mientras más al oeste de esta sub-región nos situamos, llegando a ser un 60 % en Trenque Lauquen. En los maíces de primera se apreciaba un efecto muy visible del estrés termo-hídrico sufrido durante gran parte de la floración (R1), visualizando las hojas basales quemadas, y esperando un rinde a cosecha muy heterogéneo, que podría promediar los 40-50 qq/Ha. En cambio, los maíces tardíos o de segunda estaban en plena etapa vegetativa, aguantando de mejor manera el efecto del clima.


- En lo que respecta al panorama observado desde Quemú-Quemú hacia el norte de La Pampa, las siembras fueron un 20 % de manera temprana y un 80 % tardías. El picado de lotes de maíces tempranos sea acentuó mucho en esta región, debido a que la temperatura media del aire tuvo picos de 43°C durante gran parte de diciembre y enero. Si bien no se mencionaron rindes a cosecha, los mismos van a ser muy heterogéneos al momento de la trilla. Los maíces tardíos presentaban bajo porte y estaban entrando en floración. Debido a las últimas precipitaciones se esperaba un recupero en la condición de estos lotes.

- Por último, en el corredor de la RN N°188, desde General Villegas hasta Lincoln se pudieron apreciar los mejores lotes de maíz, tanto para fechas tempranas como tardías. En esta región las siembras de primera tienen un mayor peso, llegando a ser un 70 % del total del maíz sembrado. Si bien, hubo picado de lotes puntuales, debido a que se registraron altas temperaturas y falta de precipitaciones durante diciembre y enero, la expectativa de rinde a cosecha es alta, promediando los 70 a 80 qq/Ha. Al mismo tiempo, los cuadros de maíz tardío estaban en muy buenas condiciones, en plena floración.



1) Lote de maíz en grano duro con 65 mil plantas/Ha. Rinde esperado 85 qq/Ha. Carlos Casares, Buenos Aires (10/02/14). 2) Lote de maíz tardío en buenas condiciones, aunque con falta de plantas por sequía durante el nacimiento. Intendente Alvear, La Pampa (12/02/14). 3) Lote de maíz empezando a llenar grano en muy malas condiciones. Alta Italia, La Pampa. (12/02/14).

Girasol:



- Al momento de la recorrida la recolección de girasol era prácticamente nula. Puntualmente en cercanías a Catrilló (La Pampa), ya se estaban realizando las primeras pruebas de cosecha en las lomas, en donde el cultivo se vio más afectado por la sequía y consecuentemente se aceleró el ciclo. Los rendimientos relevados si bien eran pocos, se ubicaban en torno a los 10 qq/Ha.

- En esta región, la distribución de área girasolera se concentra mayormente en la porción de La Pampa, y en Buenos Aires desde la RN 33 hacia el oeste. Al este bonaerense la aptitud de los suelos y las condiciones climáticas permiten un mejor desempeño de otros cultivos

como soja o maíz.

- En la presenta campaña se registró una merma de área sembrada en esta región en torno al -13 % (- 15.000 Ha vs. campaña 2012/13). Esta disminución en la superficie obedece principalmente a los problemas que ocasionan las aves, las cuales afectan notoriamente a este cultivo, ocasionando severas mermas sobre el rendimiento final. Según los colaboradores la siembra de girasol responde mayormente a aquellos productores que siguen una tradición con este cultivo, y a otros que apuntan a la producción puntual de materiales confiteros o de tipo alto oleico.

- Desde la RN 33 al oeste y hasta la RP 1, el cultivo se encontraba en buenas condiciones, transitando desde inicio a fin de llenado de granos, presentando buenas perspectivas a cosecha. Los rindes esperados para la zona oscilaban desde los 15 a 25 qq/Ha. En contraposición, al oeste de la RP 1 el cultivo se vio muy afectado tanto por la sequía como por el ataque continuo de insectos defoliadores. Si bien a la fecha de la recorrida no se esperaban mermas en el área a recolectar, muchos cuadros de la región estarán aportando bajas productividades, inferiores a los 10 qq/Ha.



Lote de girasol en buenas condiciones en Intendente Alvear, La Pampa (12/02/14).

- En lo que respecta al estado sanitario, y extensivo a todo el norte pampeano, se relevó presencia de isocas muy por encima del umbral del daño económico, ocasionando una enorme reducción de área foliar. En algunos cuadros se realizaron hasta tres aplicaciones, aunque en ciertos casos no se lograron en tiempo y forma. Por esta razón un gran porcentaje de los lotes presentaban las hojas con casi 100 % de daño, visualizando a simple vista las nervaduras de las hojas.



1) Girasol con severo ataque de isocas. Catriló, La Pampa (11/02/14). **2)** Lote de girasol en buenas condiciones en Intendente Alvear, La Pampa (12/02/14). **3)** Girasol sembrado a baja densidad en Lincoln, Buenos Aires, con leve ataque de insectos y buena condición de cultivo (13/02/14).

Agradecemos a los Colaboradores del Panorama Agrícola Semanal que nos recibieron en cada localidad durante la semana de recorrida y a todos los que aportaron información para la elaboración del presente informe. Por consultas, dirigirse a estimacionesagricolas@bc.org.ar.

Bolsa de Cereales
Buenos Aires, 28 de Febrero de 2014.